

- Höchste Leistung
- Hohe Überlebensrate
- Reduziert den Befall mit Kiemenwürmern erheblich



## ZUSAMMENSETZUNG:

## Analysen (%)

Protein	42	Größe: 3.0 mm
Fett	19	
Rohfaser	1,2	
Asche	8,5	
Gesamt P	1,35	

## Vitamine zugesetzt

Vitamin A (IE/kg)	16667
-------------------	-------

## Energie (MJ/kg)

Gesamt	21,1
Verdaulich	18,1

## FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG FÜR OPTIMALES WACHSTUM

Fischgewicht (g)	Futtergröße (mm)	< 12 °C	> 28 °C								
			12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C
50-100	3.0		0,55	0,66	0,80	0,97	1,18	1,42	1,72	2,08	1,66
100-200	3.0	Fütterung Je	0,50	0,60	0,73	0,88	1,06	1,28	1,55	1,88	1,50
200-300	4.5	Appetit	0,45	0,54	0,66	0,79	0,96	1,16	1,40	1,69	1,36
300-500	4.5		0,40	0,48	0,58	0,70	0,85	1,03	1,25	1,51	1,21
> 500	4.5		0,38	0,45	0,55	0,67	0,80	0,97	1,18	1,42	1,14


Fütterung Je  
Appetit und O2  
Gehalt

\* Futterungs empfehlung ist in % Biomasse/Trag.

\* Die Fütterungsempfehlung ist nur eine Richtlinie und sollte als solche verwendet werden

## ÖKOLOGISCHE DATEN:

Ableitung pro 1000 kg Produktion



Die Werte von Nährstoffen und Vitaminen beziehen sich auf die Zeit der Verfassung dieses Textes.

Aufgrund natürlicher Variationen in den Inhaltsstoffen können die Daten abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Mischungen zu ändern. Die genauen Werte finden Sie auf dem Etikett.