

2025 - 2026

CARPE

L'élevage de carpes est l'une des plus anciennes formes d'élevage de poisson. De nos jours, les élevages de carpes sont toujours destinés à des usages multiples : consommation, occupation d'eaux naturelles et viviers commerciaux.



Aliment coulant



Conçu pour les circuits fermés



Aliment flottant



Indice durabilité



Aliment semi-flottant



Avec astaxanthine



Sans protéine animale terrestre



Réduction des rejets azoté et phosphorés



Haute digestibilité



Optimisation de la santé



Acides gras Omega-3



AQUATE™

Le Prémix sera amélioré pour tous les produits Alltech Coppens

- ✚ Optimise la croissance
- ✚ Renforce la réponse immunitaire
- ✚ Optimise la fonction digestive
- ✚ Contribue à la protection de la barrière muqueuse
- ✚ Contribue à la protection de la barrière extérieure



BIO-MOS®

est un mannan-oligosaccharide qui est réputé lier et éliminer les bactéries opportunistes. Cela peut contribuer à garantir des conditions de croissance optimales pour la flore intestinale. BIO-MOS® peut également améliorer la longueur et la densité des microvillosités dans les intestins, ce qui peut aider à accroître l'absorption en éléments nutritifs. BIO-MOS® renforce la réponse immunitaire du poisson.

BIO-MOS®

Fonction intestinale améliorée

BIOPLEX®

est un élément crucial de notre nouveau prémix. Il s'agit d'oligo-éléments liés organiquement, notamment du zinc, du cuivre, du manganèse et du fer. BIOPLEX® aide à améliorer la santé, la croissance et les performances du poisson.

Rompez avec la tradition et nourrissez vos animaux d'une manière moderne.

Alltech a prouvé que les oligo-éléments chélatisés sous forme de Bioplex® et Sel-Plex® peuvent être intégrés à des niveaux nettement plus bas tout en améliorant les performances des animaux. Cela permet d'optimiser les besoins en minéraux des animaux et de réduire l'impact négatif sur l'environnement.

Nous appelons cette innovation Total Replacement Technology™ (TRT) d'Alltech.

ACTIGEN®

est dérivé des parois cellulaires de levure, Actigen® renforce le système immunitaire, ce qui permet d'améliorer la santé générale du poisson et de stimuler sa vitalité.

ACTIGEN®

Aide à maintenir le système immunitaire

TOTAL REPLACEMENT TECHNOLOGY®



Alltech® COPPENS

Aperçu des aliments pour carpes

Élevage traditionnel

Semi-intensif

Intensif

Aquaculture en circuit fermé

Granulés

Advance



Micro-granulés

Intensiv

Advance




Aliments de pré-croissance

Intensiv

Premium Select

Pre Grower-15 EF




Aliments de croissance

Intensiv


Premium Select

Grower-13 EF



Aliments de croissance avec Astax

Grower Astax



Poissons reproducteurs

Repro

- Production semi-intensive
- Haute performance
- Réduction de la mortalité
- Aliment de premier âge moyenne énergie



COMPOSITION:

Analyse (%)	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.00 mm	1.5 mm
Protéines	56	56	56	54	54
Lipides	15	15	15	15	15
Fibres	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
Cendres	11,3	11,3	11,3	9,8	9,8
Total P	1,77	1,77	1,77	1,42	1,42
Vitamines supplémentaires					
Vitamine A (IE/kg)	16667	16667	16667	11995	11995
Energie (MJ/kg)					
Brute	21,2	21,2	21,2	20,9	20,9
Digestible	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE LA CROISSANCE


Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	<10°C	10°C	12°C	14°C	16°C	18°C	20°C	22°C	24°C	26°C	>26°C
< 0,2	0,2-0,3											Nourrissage larve à satiété
0,2-0,5	0,3-0,5		2,23	2,69	3,26	3,94	4,76	5,76	6,96	8,42	7,58	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
0,5-1,5	0,5-0,8	Selon l'appétit	1,91	2,31	2,80	3,38	4,09	4,94	5,98	7,23	6,51	
1,5-5	0,5-0,8		1,66	2,01	2,43	2,94	3,56	4,30	5,21	6,29	5,67	
5,0-8,0	1,0-1,5		1,24	1,50	1,82	2,20	2,65	3,21	3,88	4,69	4,23	
8,0-15,0	1,5		1,10	1,33	1,61	1,94	2,35	2,84	3,43	4,15	3,74	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.

- Production semi-intensive
- Haute performance
- Excellent pour les poissons d'ornements



COMPOSITION:

Analyse (%)

Protéines	40	Taille:
Lipides	10	
Fibres	1,5	
Cendres	7,5	
Total P	1,41	

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg)	13333
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	19,1
Digestible	16,0

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE


Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
8-15	1,5		1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	2,69	3,25	3,94	3,54	
25-50	2,0	Selon l'appétit	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,71	3,28	2,95	Selon l'appétit du poisson et du oxygène

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valuers exactes, consultez l'étiquette.

- Aliment grossissement haute énergie
- Très attractant
- Haute performance
- Production semi-intensive
- Bon pour l'alimentation d'automne



COMPOSITION:

Analyse (%)		Taille:
Protéines	32	2.0 mm
Lipides	15	
Fibres	1,7	
Cendres	7,8	
Total P	1,41	
Vitaminees supplémentaires		
Vitamine A (IE/kg)	10002	
Energie (MJ/kg)		
Brute	19,6	
Digestible	16,4	

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE


oids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
15-25	2,0		1,06	1,28	1,55	1,87	2,26	2,73	3,31	4,00	3,60	
25-50	2,0	Selon l'appétit	0,93	1,13	1,36	1,65	1,99	2,41	2,92	3,53	3,17	Selon l'appétit du poisson et du oxygène

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.

- Aliment moyenne énergie
- Production semi-intensive
- Haute performance



COMPOSITION:

Analyse (%)

Protéines	40	Taille: 2.0 mm
Lipides	10	
Fibres	1,5	
Cendres	7,5	
Total P	1,41	

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg)	13333
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	19,1
Digestible	16,0

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

oids du poisson (€ Taille granulé (mm))	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
15-25	2,0		1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	2,69	3,25	3,94	3,54
25-50	2,0		0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,71	3,28	2,95


Selon l'appétit du poisson et du oxygène

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 K



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.

- Haute performance
- Très attractant
- Contrôle du nourrissage visuel



COMPOSITION:

Analyse (%)

		Taille:
Protéines	50	2.0 mm
Lipides	15	
Fibres	0,5	
Cendres	7,6	
Total P	1,33	

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg)	11667
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	21,3
Digestible	19,2

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE


Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
15-25	2,0	Selon l'appétit	0,93	1,13	1,37	1,65	2,00	2,42	2,92	3,53	3,18	Selon l'appétit
25-50	2,0		0,82	1,00	1,20	1,46	1,76	2,13	2,58	3,11	2,80	du poisson et du oxygène

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.



- Aliment grossissement haute énergie
- Très attractant
- Haute performance
- Production semi-intensive
- Bon pour l'alimentation d'automne

COMPOSITION:

Analyse (%)	3.0-8.0 mm	.0-20.0 mm	Taille:
Protéines	32	32	3.0 mm
Lipides	15	15	4.5 mm
Fibres	1,7	1,5	6.0 mm
Cendres	7,8	11,9	8.0 mm
Total P	1,41	2,10	14.0 mm 20.0 mm

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg)	10002	10000
--------------------	-------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	19,6	19,4
Digestible	16,4	16,0

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE


Poids du poisson (g) Taille granulé (mm)	< 10 °C	> 26 °C									
		10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
50-100	3,0	0,83	1,00	1,21	1,47	1,77	2,14	2,59	3,14	2,82	
100-250	4,5	0,65	0,78	0,94	1,14	1,38	1,67	2,02	2,44	2,20	
250-500	6,0	0,55	0,67	0,81	0,98	1,19	1,43	1,73	2,10	1,89	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
500-1000	6,0	0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	1,25	1,51	1,82	1,64	
1000-2000	8,0	0,42	0,51	0,61	0,74	0,90	1,09	1,31	1,59	1,43	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.



- Aliment moyenne énergie
- Production semi-intensive
- Haute performance

COMPOSITION:

Analyse (%)

		Taille:
Protéines	40	3.0 mm
Lipides	10	4.5 mm
Fibres	1,6	6.0 mm
Cendres	11,3	9.0 mm
Total P	1,97	

Vitamines supplémentaires

Vitamine A (IE/kg)	10004
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	18,7
Digestible	15,2

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE


âges du poisson (g) Taille granulé (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
50-100	3,0	0,84	1,02	1,23	1,49	1,80	2,18	2,63	3,19	2,87	
100-250	4,5	Selon l'appétit	0,66	0,79	0,96	1,16	1,40	1,70	2,05	2,48	2,23
250-500	4,5		0,56	0,68	0,82	1,00	1,20	1,46	1,76	2,13	1,92
500-1000	6,0		0,49	0,59	0,72	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	1,67
1000-2000	9,0		0,43	0,52	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,45

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.

- Production semi-intensive
- Haute performance
- Très attractant
- Contrôle du nourrissage visuel



COMPOSITION:

Analyse (%)

		Taille:
Protéines	42	3,0 mm
Lipides	13	4,5 mm
Fibres	1,5	6,0 mm
Cendres	12,9	
Total P	2,21	

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg)	10000
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	19,2
Digestible	15,9

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE


Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	26 °C
50-100	3,0	Selon l'appétit	0,80	0,97	1,18	1,42	1,72	2,08	2,51	3,04	2,74	
100-250	4,5		0,63	0,76	0,91	1,11	1,34	1,62	1,96	2,37	2,13	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
250-500	6,0		0,54	0,65	0,79	0,95	1,15	1,39	1,68	2,03	1,83	
500-1000	6,0		0,47	0,57	0,68	0,83	1,00	1,21	1,46	1,77	1,59	
1000-2000	6,0		0,41	0,49	0,60	0,72	0,87	1,05	1,27	1,54	1,39	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.

- Production semi-intensive
- Haute performance
- Contrôle du nourrissage visuel



COMPOSITION:

Analyse (%)

Protéines	38	Taille:
Lipides	8	4.5 mm
Fibres	1,8	6.0 mm
Cendres	11,1	8.0 mm
Total P	1,85	
Astaxanthine (mg/kg)	25	

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg)	10000
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	17,9
Digestible	14,6

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE


Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
100-250	4.5		0,69	0,83	1,01	1,22	1,47	1,78	2,16	2,61	2,35	
250-500	6.0	Selon l'appétit	0,59	0,72	0,87	1,05	1,27	1,53	1,85	2,24	2,01	Selon l'appétit du poisson et du oxygène
500-1000	6.0		0,52	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,95	1,75	
1000-2000	8.0		0,45	0,54	0,66	0,79	0,96	1,16	1,40	1,70	1,53	

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.



- Aliment spécialisé pour géniteurs
- Optimise le développement embryonnaire
- Amélioration de la qualité et la survie des oeufs

COMPOSITION:

Analyse (%)

		Taille:
Protéines	48	6.0 mm
Lipides	15	9.0 mm
Fibres	1,2	
Cendres	8,3	
Total P	1,34	
Astaxanthine (mg/kg)	40	

Vitaminees supplémentaires

Vitamine A (IE/kg)	25001
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Brute	20,6	
Digestible	17,8	

TABLE DE NOURRISSAGE POUR OPTIMISATION DE L'INDICE

Poids du poisson (g)	Taille granulé (mm)	< 10 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	> 26 °C
> 1500	6,0/9,0		0,35	0,43	0,52	0,63	0,76	0,91	1,11	1,34	1,20	

Selon l'appétit


Selon l'appétit du poisson et du oxygène

* Ce nourrissage conseillé est exprimé en % de la biomasse par jour.

* Il ne s'agit d'un guide indicatif et doit être utilisé comme tel.

DONNÉES ÉCOLOGIQUES:

Écoulement pour une production de 1000 k



Les valeurs des nutriments et des Vitaminees sont celles relevées au moment de la rédaction de ce document.

Elles peuvent varier, en raison des variations naturelles des ingrédients. Nous nous réservons le droit de modifier nos formulations sans préavis.

Pour les valeurs exactes, consultez l'étiquette.