

- Hoog energie startvoer
- Intensieve kweek
- Zeer goede prestaties
- Hoge overleving
- Fasevoer voor optimale efficiëntie



SAMENSTELLING:

Analyse (%)	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
Eiwit	63	60	58	56
Vet	12	15	18	21
Ruwe celstof	0,3	0,3	0,3	0,3
As	12,0	11,5	10,2	9,8
Totaal P	1,68	1,61	1,54	1,49

Toegevoegd vitamines

Vitamine A (IE/kg)	14000	14000	12000	12000
--------------------	-------	-------	-------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	21,4	22,1	22,7	23,3
Verteerbaar	19,7	20,4	20,8	21,4

VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
< 0,2	0.3-0.5		2,41	2,91	3,52	4,26	5,15	6,23	5,05	
0,2-0,5	0.5-0.8		2,15	2,60	3,15	3,81	4,61	5,57	4,51	
0,5-2,0	1.0	Volgens behoefte	1,67	2,02	2,44	2,95	3,57	4,32	3,50	Volgens behoefte en O2 niveau
2-5	1.0/1.5		1,36	1,64	1,99	2,40	2,91	3,51	2,85	
5-12	1.5		1,14	1,38	1,66	2,01	2,43	2,94	2,38	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.