

- Zeer goede prestaties
- Grote overlevingskans
- Vermindert de besmetting met kieuwwormen aanzienlijk



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	42	Maten:	3.0 mm
Vet	19		
Ruwe celstof	1,2		
As	8,5		
Totaal P	1,35		

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	16667
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	21,1
Verteerbaar	18,1

VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 12 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C	22 °C	24 °C	26 °C	28 °C	> 28 °C
50-100	3.0		0,55	0,66	0,80	0,97	1,18	1,42	1,72	2,08	1,66	
100-200	3.0	Volgens behoefte	0,50	0,60	0,73	0,88	1,06	1,28	1,55	1,88	1,50	Volgens behoefte en O2 niveau
200-300	4.5		0,45	0,54	0,66	0,79	0,96	1,16	1,40	1,69	1,36	
300-500	4.5		0,40	0,48	0,58	0,70	0,85	1,03	1,25	1,51	1,21	
> 500	4.5		0,38	0,45	0,55	0,67	0,80	0,97	1,18	1,42	1,14	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waarden van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waarden zie het label.