

2023 - 2024

FOREL

Onze forelvoerders zorgen voor een ongeëvenaarde en efficiënte groei. Tevens wordt de impact op het milieu sterk geminimaliseerd. Een deel van het programma is uitermate geschikt voor kweek in RAS.



Zinkend voer



Drijvend voer



Semi-drijvend voer



Bevat geen eiwit van landdieren



Hoog verteerbaar



Omega-3 vetzuren



Ontworpen voor RAS



Duurzaamheidsscore



Bevat astaxanthine



Lage uitstoot van stikstof en fosfor



Verbeterde weerstand



FOREL

AQUATE™

Verbeterde premix in alle Alltech Coppens voeders.

- + Optimaliseert de groei
- + Ondersteunt de immuunrespons
- + Optimaliseert de darmwerking
- + Draagt bij aan de bescherming van de slijmvliesbarrière
- + Draagt bij aan de bescherming van de externe barrière



BIO-MOS®

is een mannaanooligosacharide, waarvan bekend is dat hij optimistische bacteriën bindt en afvoert. Hierdoor kan de darmflora worden geoptimaliseerd. Ook de lengte en dichtheid van de microvilli in de darmen kunnen worden verhoogd, waardoor de voedingsstoffenopname kan toenemen. **BIO-MOS®** ondersteunt de immuun response.

ACTIGEN®

is gebaseerd op gistcelwanden en ondersteunt het immuunsysteem. **Actigen®** ondersteunt daardoor de algehele gezondheid van de vis en stimuleert zijn vitaliteit.

BIO-MOS®

Verbeterd
darmfunctie

BIOPLEX®

Verbeterd
prestaties

AQUATE™

ACTIGEN®

Helpt bij de
instandhouding
van het
immuunsysteem

TOTAL REPLACEMENT TECHNOLOGY®

BIOPLEX®


is een zeer belangrijk onderdeel van onze nieuwe premix. **BIOPLEX®** bestaat uit organisch gebonden sporenelementen zoals zink, koper, mangaan en ijzer. Met **BIOPLEX®** kunnen de gezondheid, groei en prestaties van de vis verbeterd worden.

**Doorbreek de traditie en
voed je dieren op een
moderne manier.**

Alltech heeft bewezen dat gechelateerde sporenelementen in de vorm van Bioplex® en Sel-Plex® in aanzienlijk lagere hoeveelheden opgenomen kunnen worden, terwijl de dierlijke prestaties toch verbeteren. Dit optimaliseert de behoefte van dieren aan mineralen en vermindert negatieve invloeden op het milieu. We noemen deze innovatie de Total Replacement Technology™ (TRT) van Alltech.



Forelvoer schema



- Ontworpen voor semi-intensive kweek
- Zeer goede prestaties
- Grote overlevingskans
- Middel energie startvoer



SAMENSTELLING:

Analyse (%)	0.2-0.3 mm	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.00 mm	1.5 mm
Eiwit	56	56	56	54	54
Vet	15	15	15	15	15
Ruwe celstof	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
As	11,30	11,30	11,30	11,96	11,96
Totaal P	1,77	1,77	1,77	1,75	1,75

Toegevoegde vitaminen

Vitamine A (IE/kg)	16085	16085	16085	12000	
--------------------	-------	-------	-------	-------	--

Energie (MJ/kg)

Bruto	21,2	21,2	21,2	20,6	20,6
Verteerbaar	19,2	19,2	19,2	19,0	19,0

VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
0.10-0.15	0.2-0.3	Volgens behoefte	2,68	3,24	3,91	4,73	5,72	6,92	5,61	Volgens behoefte en O2 niveau
0.15-0.2	0.3-0.5		2,45	2,97	3,59	4,34	5,25	6,35	5,14	
0.2-0.5	0.5-0.8		2,19	2,65	3,21	3,88	4,69	5,67	4,60	
0.5-2.0	1.0		1,79	2,16	2,61	3,16	3,82	4,62	3,75	
2-5	1.0/1.5		1,43	1,73	2,10	2,54	3,07	3,71	3,01	
5-12	1.5		1,18	1,43	1,72	2,09	2,52	3,05	2,47	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waarden van de nutriënten en de vitaminen zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waarden zie het label.

- Hoog energie startvoer
- Intensieve kweek
- Zeer goede prestaties
- Grote overlevingskans
- Fasevoer voor optimale efficiëntie



SAMENSTELLING:

Analyse (%)	0.3-0.5 mm	0.5-0.8 mm	1.0 mm	1.5 mm
Eiwit	63	60	58	56
Vet	12	16	18	21
Ruwe celstof	0,3	0,3	0,2	0,2
As	11,1	10,7	12,3	11,9
Totaal P	1,70	1,64	1,76	1,70

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	16667	16001	13333	13333
--------------------	-------	-------	-------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	21,6	22,3	21,5	22,2
Verteerbaar	19,8	20,5	20,0	20,6

VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
<0.2	0.3-0.5		2,41	2,91	3,52	4,26	5,15	6,23	5,05	
0.2-0.5	0.5-0.8	Volgens behoefte	2,15	2,60	3,15	3,81	4,61	5,57	4,51	Volgens behoefte en O2 niveau
0.5-2.0	1.0		1,67	2,02	2,44	2,95	3,57	4,32	3,50	
2-5	1.0-1.5		1,36	1,64	1,99	2,40	2,91	3,51	2,85	
5-12	1.5		1,14	1,38	1,66	2,01	2,43	2,94	2,38	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Medium energie voer
- Ontworpen voor semi-intensive kweek
- Zeer goede prestaties



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	45	Maten:	2.0 mm
Vet	18		
Ruwe celstof	1,3		
As	9,3		
Totaal P	1,50		

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	11877
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	21,2
Verteerbaar	18,9

VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
10-20	2.0	Volgens behoefte	1,03	1,24	1,50	1,81	2,19	2,65	2,15	Volgens behoefte en O2 niveau
20-35	2.0		0,93	1,12	1,35	1,64	1,98	2,39	1,94	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waarden van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waarden zie het label.

- Zeer goede prestaties
- Hoog energie voer
- Ontworpen voor RAS en Intensieve kweek
- Gunstige DP:DE ratio



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

2.0 mm

Eiwit	46
Vet	24
Ruwe celstof	1,1
As	6,8
Totaal P	1,03

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	11667
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	23,4
Verteerbaar	21,1

VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
10-20	2.0		0,95	1,15	1,40	1,69	2,04	2,47	2,00	
20-35	2.0	Volgens behoefte	0,86	1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	1,81	Volgens behoefte en O2 niveau

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waarden van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waarden zie het label.

- Ontwikkeld voor gebruik bij moeilijke kweekomstandigheden
- Ondersteunt de vis bij stress door ongunstige kweekomstandigheden
- Tevens geschikt voor beekridder en beekforel



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	50	Maten:	2.0 mm
Vet	18		
Ruwe celstof	0,8		
As	8,6		
Totaal P	1,27		

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	15200
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	21,7
Verteerbaar	19,6

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
10-20	2.0		1,01	1,22	1,48	1,79	2,16	2,61	2,12	
20-35	2.0	Volgens behoefte	0,91	1,10	1,34	1,61	1,95	2,36	1,91	Volgens behoefte en O2 niveau

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waarden van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waarden zie het label.

- Medium energie voer
- Ontworpen voor semi-intensive kweek
- Goede prestaties
- Hoge vleeskwaliiteit



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	39 - 41
Vet	19 - 22
Ruwe celstof	1 - 2
As	4 - 8
Totaal P	0,81

Maten:

	3.0 mm
	4.5 mm
	6.0 mm

Toegevoegde vitaminen

Vitamine A (IE/kg)	8936
--------------------	------

Energie (MJ/kg)

Bruto	21.2 - 23.2
Verteerbaar	18.8 - 19.2
Net energie	14,2

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):

Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		0,77	0,93	1,12	1,36	1,64	1,99	1,61	
100-200	3.0/4.5		0,62	0,75	0,90	1,09	1,32	1,59	1,29	
200-300	4.5		0,56	0,67	0,81	0,98	1,19	1,44	1,17	
300-400	4.5		0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	1,35	1,09	
400-500	6.0	Volgens behoefte	0,49	0,60	0,72	0,87	1,06	1,28	1,04	Volgens behoefte en O2 niveau
500-750	6.0		0,47	0,56	0,68	0,83	1,00	1,21	0,98	
750-1000	6.0		0,44	0,53	0,64	0,77	0,93	1,13	0,91	
1000-1500	6.0		0,40	0,49	0,59	0,71	0,86	1,04	0,85	
1500-2000	6.0		0,38	0,46	0,55	0,67	0,81	0,98	0,79	
2000-3000	6.0		0,35	0,42	0,51	0,62	0,75	0,91	0,74	

VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		1,11	1,35	1,63	1,97	2,38	2,88	2,33	
100-200	3.0/4.5		0,89	1,08	1,31	1,58	1,91	2,31	1,87	
200-300	4.5		0,81	0,98	1,18	1,43	1,73	2,09	1,69	
300-400	4.5	Volgens behoefte	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,95	1,58	Volgens behoefte en O2 niveau
400-500	6.0		0,72	0,87	1,05	1,27	1,53	1,86	1,50	
500-750	6.0		0,68	0,82	0,99	1,20	1,45	1,75	1,42	
750-1000	6.0		0,63	0,76	0,92	1,12	1,35	1,63	1,32	
1000-1500	6.0		0,58	0,71	0,86	1,03	1,25	1,51	1,23	
1500-2000	6.0		0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	1,41	1,15	
2000-3000	6.0		0,51	0,62	0,74	0,90	1,09	1,32	1,07	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitaminen zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Medium energie voer
- Ontworpen voor semi-intensive kweek
- Goede prestaties
- Hoge vleeskwaliiteit



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	43 - 45	Maten: 3.0 mm
Vet	20 - 23	4.5 mm
Ruwe celstof	1 - 2	6.0 mm
As	4 - 8	
Totaal P	0,82	

Toegevoegde vitaminen

Vitamine A (IE/kg)	9138
--------------------	------

Energie (MJ/kg)

Bruto	21.4 - 23.4
Verteerbaar	19.2 - 19.5
Net energie	14,40

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):

Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		s	0,92	1,11	1,34	1,62	1,96	1,59	
100-200	3.0/4.5		0,61	0,74	0,89	1,08	1,30	1,57	1,27	
200-300	4.5		0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	1,42	1,15	
300-400	4.5		0,51	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,08	
400-500	6.0	Volgens behoefte	0,49	0,59	0,71	0,86	1,04	1,26	1,02	Volgens behoefte en O2 niveau
500-750	6.0		0,46	0,56	0,67	0,81	0,99	1,19	0,97	
750-1000	6.0		0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	0,90	
1000-1500	6.0		0,40	0,48	0,58	0,70	0,85	1,03	0,83	
1500-2000	6.0		0,37	0,45	0,54	0,66	0,80	0,96	0,78	
2000-3000	6.0		0,35	0,42	0,51	0,61	0,74	0,90	0,73	


VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI

Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		1,10	1,33	1,61	1,94	2,35	2,84	2,30	
100-200	3.0/4.5		0,88	1,07	1,29	1,56	1,89	2,28	1,85	
200-300	4.5	Volgens behoefte	0,80	0,96	1,16	1,41	1,70	2,06	1,67	Volgens behoefte en O2 niveau
300-400	4.5		0,74	0,90	1,09	1,32	1,59	1,92	1,56	
400-500	6.0		0,71	0,86	1,04	1,25	1,51	1,83	1,48	
500-750	6.0		0,67	0,81	0,98	1,18	1,43	1,73	1,40	
750-1000	6.0		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,31	
1000-1500	6.0		0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,49	1,21	
1500-2000	6.0		0,54	0,65	0,79	0,95	1,15	1,39	1,13	
2000-3000	6.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:



De waardes van de nutriënten en de vitaminen zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Hoog in dierlijk eiwit en vrij van soja
- Zeer geschikt voor vis die wordt uitgezet
- Hoge vleeskwiteit



SAMENSTELLING:

Analyse (%)	3.0 mm	4.5-6.0 mm
Eiwit	45-47	45-47
Vet	19-21	21-23
Ruwe celstof	0.5-1.0	0.5-1.0
As	6-10	6-10
Totaal P	1,26	1,20

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	15000	15000
--------------------	-------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	21.0 - 23.0	21.3 - 23.3
Verteerbaar	19.6 - 20.0	20.0 - 20.4
Net energie	14,6	15,0


VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):

Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
20-30	3.0	Volgens behoefte	0,75	1,15	1,50	1,60	1,60	1,50	1,25	Volgens behoefte en O2 niveau
30-70	3.0		0,70	1,05	1,35	1,45	1,45	1,35	1,10	
70-200	4.5		0,60	0,85	1,00	1,10	1,10	1,05	0,90	
200-400	4.5		0,50	0,70	0,80	0,90	0,90	0,85	0,70	
400-700	6.0		0,40	0,65	0,75	0,85	0,85	0,80	0,65	
700-1000	6.0		0,40	0,60	0,70	0,80	0,80	0,75	0,60	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:



De waarden van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waarden zie het label.



- Ontworpen voor semi-intensive kweek
- Goede prestaties
- Fasevoer voor optimale efficiëntie
- Optische voercontrole

SAMENSTELLING:

Analyse (%)	3.0 mm	4.5 mm	6.0 mm
Eiwit	39 - 42	39 - 41	38 - 41
Vet	18 - 21	19 - 21	19 - 22
Ruwe celstof	1 - 2	1 - 2	1 - 2
As	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Totaal P	0,84	0,80	0,81

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	8868	8868	8868
--------------------	------	------	------

Energie (MJ/kg)

Bruto	20.9 - 22.9	21.1 - 23.1	21.3 - 23.3
Verteerbaar	18.5 - 18.9	18.7 - 19.1	18.9 - 19.3
Net energie	13,8	14,0	14,2

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):

Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		0,78	0,94	1,14	1,37	1,66	2,01	1,63	
100-200	3.0/4.5		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,31	
200-300	4.5	Volgens behoefte	0,56	0,68	0,82	1,00	1,20	1,46	1,18	Volgens behoefte en O2 niveau
300-400	4.5		0,53	0,64	0,77	0,93	1,13	1,36	1,10	
400-500	6.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	
500-750	6.0		0,47	0,57	0,69	0,84	1,01	1,22	0,99	
750-1000	6.0		0,44	0,53	0,65	0,78	0,94	1,14	0,92	
1000-1500	6.0		0,41	0,49	0,60	0,72	0,87	1,06	0,86	
1500-2000	6.0		0,38	0,46	0,56	0,68	0,82	0,99	0,80	
2000-3000	6.0		0,36	0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	0,74	

VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		1,13	1,36	1,65	1,99	2,41	2,91	2,36	
100-200	3.0/4.5		0,90	1,09	1,32	1,60	1,93	2,34	1,90	
200-300	4.5	Volgens behoefte	0,82	0,99	1,19	1,44	1,75	2,11	1,71	Volgens behoefte en O2 niveau
300-400	4.5		0,76	0,92	1,12	1,35	1,63	1,97	1,60	
400-500	6.0		0,73	0,88	1,06	1,28	1,55	1,88	1,52	
500-750	6.0		0,69	0,83	1,00	1,21	1,47	1,77	1,44	
750-1000	6.0		0,64	0,77	0,94	1,13	1,37	1,65	1,34	
1000-1500	6.0		0,59	0,72	0,87	1,05	1,27	1,53	1,24	
1500-2000	6.0		0,55	0,67	0,81	0,98	1,18	1,43	1,16	
2000-3000	6.0		0,52	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,08	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Ontworpen voor RAS en Intensieve kweek
- Zeer goede prestaties
- Zeer geschikt voor beekridder en hybriden
- Gunstige DP:DE ratio
- Hoge energie fase voer



SAMENSTELLING:

Analyse (%)	3.0 mm	4.5 mm
Eiwit	43 - 45	42 - 44
Vet	24 - 27	26 - 29
Ruwe celstof	4 - 8	4 - 8
As	1 - 2	1 - 2
Totaal P	0,8	0,8

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	9678	9678	9678
--------------------	------	------	------

Energie (MJ/kg)

Bruto	22.5 - 24.5	23.0 - 25.0	23,5 - 25,5
Verteerbaar	20.4 - 20.8	20.9 - 21.3	21,4 - 21,8
Net energie	15,7	16,2	16,7

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		0,72	0,87	1,05	1,27	1,54	1,86	1,51	
100-200	3.0/4.5	Volgens behoefte	0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,49	1,21	Volgens behoefte en O2 niveau
200-300	4.5		0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	1,35	1,09	
300-400	4.5		0,49	0,59	0,71	0,86	1,04	1,26	1,02	
400-500	4.5		0,46	0,56	0,68	0,82	0,99	1,20	0,97	
500-750	4.5		0,44	0,53	0,64	0,77	0,94	1,13	0,92	
750-1000	4.5		0,41	0,49	0,60	0,72	0,87	1,05	0,85	

VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI

Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		1,04	1,26	1,52	1,84	2,23	2,70	2,18	
100-200	3.0/4.5	Volgens behoefte	0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	2,16	1,75	Volgens behoefte en O2 niveau
200-300	4.5		0,76	0,91	1,10	1,34	1,62	1,95	1,58	
300-400	4.5		0,71	0,85	1,03	1,25	1,51	1,83	1,48	
400-500	4.5		0,67	0,81	0,98	1,19	1,44	1,74	1,41	
500-750	4.5		0,63	0,77	0,93	1,12	1,36	1,64	1,33	
750-1000	4.5		0,59	0,72	0,87	1,05	1,26	1,53	1,24	

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waarden van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waarden zie het label.

- Ontworpen voor RAS en Intensieve kweek
- Zeer goede prestaties
- Gunstige DP:DE ratio
- Hoge energie fase voer



SAMENSTELLING:

Analyse (%)	3.0 mm	4.5 mm	6.0 mm
Eiwit	41 - 44	41 - 43	40 - 43
Vet	28 - 31	30 - 33	31 - 34
Ruwe celstof	1 - 2	1 - 2	1 - 2
As	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Totaal P	0,9	0,9	0,9

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	10000	10000	10000
--------------------	-------	-------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	23.5 - 25.5	23.7 - 25.7	24.1 - 26.1
Verteerbaar	21.9 - 22.2	22.1 - 22.4	22.5 - 22.8
Net energie	16,8	17,1	17,4

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):

Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0	Volgens behoefte	0,70	0,85	1,03	1,25	1,51	1,82	1,48	Volgens behoefte en O2 niveau
100-200	3.0/4.5		0,57	0,68	0,83	1,00	1,21	1,46	1,18	
200-300	4.5		0,51	0,62	0,75	0,90	1,09	1,32	1,07	
300-400	4.5		0,48	0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,00	
400-500	6.0		0,45	0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	0,95	
500-750	6.0		0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	0,90	
750-1000	6.0		0,40	0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	0,84	
1000-1500	6.0		0,37	0,45	0,54	0,65	0,79	0,96	0,78	
1500-2000	6.0		0,35	0,42	0,51	0,61	0,74	0,89	0,72	
2000-3000	6.0		0,32	0,39	0,47	0,57	0,69	0,83	0,67	

VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0	Volgens behoefte	1,02	1,23	1,49	1,81	2,18	2,64	2,14	Volgens behoefte en O2 niveau
100-200	3.0/4.5		0,82	0,99	1,20	1,45	1,75	2,12	1,72	
200-300	4.5		0,74	0,89	1,08	1,31	1,58	1,91	1,55	
300-400	4.5		0,69	0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	1,45	
400-500	6.0		0,66	0,80	0,96	1,16	1,41	1,70	1,38	
500-750	6.0		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,30	
750-1000	6.0		0,58	0,70	0,85	1,02	1,24	1,50	1,21	
1000-1500	6.0		0,54	0,65	0,78	0,95	1,15	1,39	1,12	
1500-2000	6.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	
2000-3000	6.0		0,47	0,56	0,68	0,83	1,00	1,21	0,98	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Zeer geschikt voor vis die wordt uitgezet
- Sterke, mooi gevormde vis
- Ideaal voor beekforel



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	49	Maten:	4.5 mm
Vet	16		
Ruwe celstof	0,8		
As	11,8		
Totaal P	1,70		
Astaxanthin (mg/kg)	15		

Toegevoegde vitaminen

Vitamine A (IE/kg)	15005
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	20,5
Verteerbaar	18,4

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
70-200	4.5		0,85	1,00	1,15	1,30	1,35	1,30	1,10	
200-400	4.5	Volgens behoefte	0,75	0,90	1,05	1,20	1,25	1,20	1,00	Volgens behoefte en O2 niveau

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitaminen zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Medium energie voer
- Goede prestaties
- Hoge vleeskwaliiteit
- Ontworpen voor semi-intensive kweek



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	41 - 44	Maten:	4.5 mm
Vet	20 - 23		6.0 mm
Ruwe celstof	1 - 2		8.0 mm
As	5 - 9		
Totaal P	0,84		
Astaxanthin (mg/kg)	60		

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	9067
--------------------	------

Energie (MJ/kg)

Bruto	21.4 - 23.4
Verteerbaar	19.2 - 19.5
Net energie	14,4

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):

Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
100-200	4.5		0,61	0,74	0,89	1,08	1,30	1,57	1,27	
200-300	4.5		0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	1,42	1,15	
300-400	4.5		0,51	0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,08	
400-500	6.0		0,49	0,59	0,71	0,86	1,04	1,26	1,02	
500-750	6.0	Volgens behoefte	0,46	0,56	0,67	0,81	0,99	1,19	0,97	Volgens behoefte en O2 niveau
750-1000	6.0		0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	0,90	
1000-1500	8.0		0,40	0,48	0,58	0,70	0,85	1,03	0,83	
1500-2000	8.0		0,37	0,45	0,54	0,66	0,80	0,96	0,78	
2000-3000	8.0		0,35	0,42	0,51	0,61	0,74	0,90	0,73	


VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI

Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
100-200	4.5		0,88	1,07	1,29	1,56	1,89	2,28	1,85	
200-300	4.5		0,80	0,96	1,16	1,41	1,70	2,06	1,67	
300-400	4.5		0,74	0,90	1,09	1,32	1,59	1,92	1,56	
400-500	6.0	Volgens behoefte	0,71	0,86	1,04	1,25	1,51	1,83	1,48	Volgens behoefte en O2 niveau
500-750	6.0		0,67	0,81	0,98	1,18	1,43	1,73	1,40	
750-1000	6.0		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,31	
1000-1500	8.0		0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,49	1,21	
1500-2000	8.0		0,54	0,65	0,79	0,95	1,15	1,39	1,13	
2000-3000	8.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Hoge vleeskwiteit
- Hoog in dierlijk eiwit en vrij van soja
- Zeer geschikt voor vis die wordt uitgezet



SAMENSTELLING:

Analyse (%)	4.5-6.0 mm	8.0 mm
Eiwit	45-47	43-45
Vet	21-23	23-25
Ruwe celstof	0.5-1.0	0.5-1.0
As	6-10	6-10
Totaal P	1,36	1,26
Astaxanthin (mg/kg)	80	60

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	15000	15000
--------------------	-------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	21.3 - 23.3	21.6 - 23.6
Verteerbaar	19.9 - 20.3	20.3 - 20.6
Net energie	15,0	15,4

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
70-200	4.5	Volgens behoefte	0,60	0,85	1,00	1,10	1,10	1,05	0,90	Volgens behoefte en O2 niveau
200-400	4.5		0,50	0,70	0,80	0,90	0,90	0,85	0,70	
400-700	6.0		0,40	0,65	0,75	0,85	0,85	0,80	0,65	
700-1000	6.0		0,40	0,60	0,70	0,80	0,80	0,75	0,60	
1000-1500	8,0		0,35	0,55	0,65	0,75	0,75	0,70	0,55	
1500-2000	8,0		0,30	0,45	0,55	0,70	0,70	0,65	0,50	
≥ 2000	8,0		0,25	0,4	0,5	0,6	0,6	0,55	0,45	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Ontworpen voor RAS en Intensieve kweek
- Zeer goede prestaties
- Hoge energie fase voer
- Gunstige DP:DE ratio



SAMENSTELLING:

Analyse (%)	3.0 mm	4.5 mm	6.0 mm
Eiwit	41 - 44	41 - 43	40 - 43
Vet	29 - 32	30 - 33	31 - 34
Ruwe celstof	1 - 2	1 - 2	1 - 2
As	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Totaal P	0,9	0,9	0,9
Astaxanthin (mg/kg)	80,02	79,97	80,04

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	10000	10000	10000
--------------------	-------	-------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	23.5 - 25.5	23.7 - 25.7	24.1 - 26.1
Verteerbaar	21.9 - 22.2	22.1 - 22.4	22.5 - 22.8
Net energie	16,8	17,1	17,4

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		0,70	0,85	1,03	1,25	1,51	1,82	1,48	
100-200	3.0/4.5		0,57	0,68	0,83	1,00	1,21	1,46	1,18	
200-300	4.5	Volgens behoefte	0,51	0,62	0,75	0,90	1,09	1,32	1,07	Volgens behoefte en O2 niveau
300-400	4.5		0,48	0,58	0,70	0,84	1,02	1,23	1,00	
400-500	6.0		0,45	0,55	0,66	0,80	0,97	1,17	0,95	
500-750	6.0		0,43	0,52	0,63	0,76	0,92	1,11	0,90	
750-1000	6.0		0,40	0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	0,84	
1000-1500	6.0		0,40	0,48	0,58	0,71	0,85	1,03	0,84	
1500-2000	6.0		0,37	0,45	0,54	0,65	0,79	0,96	0,78	
2000-3000	6.0		0,35	0,42	0,51	0,61	0,74	0,89	0,72	

VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI

Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
35-100	3.0		1,02	1,23	1,49	1,81	2,18	2,64	2,14	
100-200	3.0/4.5		0,82	0,99	1,20	1,45	1,75	2,12	1,72	
200-300	4.5	Volgens behoefte	0,74	0,89	1,08	1,31	1,58	1,91	1,55	Volgens behoefte en O2 niveau
300-400	4.5		0,69	0,84	1,01	1,22	1,48	1,79	1,45	
400-500	6.0		0,66	0,80	0,96	1,16	1,41	1,70	1,38	
500-750	6.0		0,62	0,75	0,91	1,10	1,33	1,61	1,30	
750-1000	6.0		0,58	0,70	0,85	1,02	1,24	1,50	1,21	
1000-1500	6.0		0,58	0,70	0,85	1,02	1,24	1,50	1,21	
1500-2000	6.0		0,54	0,65	0,78	0,95	1,15	1,39	1,12	
2000-3000	6.0		0,50	0,61	0,73	0,89	1,07	1,30	1,05	

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Ontwikkeld voor gebruik bij moeilijke kweekomstandigheden
- Ondersteunt de vis bij stress door ongunstige kweekomstandigheden
- Tevens geschikt voor beekridder en beekforel



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	46	Maten:	3.0 mm
Vet	18		4.5 mm
Ruwe celstof	0,9		
As	8,3		
Totaal P	1,35		

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	15000
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	21,3
Verteerbaar	19,2

VOERTABEL VOOR EEN LAGE VOERCONVERSIE (FCR):


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
20-30	3.0		0,75	1,15	1,5	1,6	1,6	1,5	1,25	
30-70	3.0	Volgens behoefte	0,7	1,05	1,35	1,45	1,45	1,35	1,1	Volgens behoefte en O2 niveau
70-200	4.5		0,7	0,85	1,05	1,2	1,35	1,3	1,2	
200-400	4.5		0,55	0,7	0,85	1	1,1	1,1	1	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.

- Ouderdierenvoer
- Optimale ontwikkeling van de eitjes
- Hoge kwaliteit en overleving van de broed



SAMENSTELLING:

Analyse (%)

Eiwit	48	Maten:	6.0 mm
Vet	15		9.0 mm
Ruwe celstof	1,2		
As	8,9		
Totaal P	1,36		
Astaxanthin (mg/kg)	40		

Toegevoegde vitamines

Vitamine A (IE/kg)	24998
--------------------	-------

Energie (MJ/kg)

Bruto	20,7
Verteerbaar	18,5

VOERTABEL VOOR OPTIMALE GROEI


Visgewicht (g)	Voermaat (mm)	< 6 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	> 18 °C
400-500	6,0		0,41	0,49	0,60	0,72	0,87	1,06	0,86	
500-750	6,0		0,39	0,47	0,56	0,68	0,82	1,00	0,81	
750-1000	6,0	Volgens behoefte	0,36	0,43	0,53	0,64	0,77	0,93	0,75	Volgens behoefte en O2 niveau
1000-1500	9,0		0,33	0,40	0,49	0,59	0,71	0,86	0,70	
1500-2500	9,0		0,30	0,37	0,44	0,54	0,65	0,78	0,63	
2500-4000	9,0		0,28	0,34	0,41	0,49	0,60	0,72	0,59	

* Voederadvies is uitgedrukt in % biomassa/dag.

* Voederadvies is slechts een richtlijn en dient overeenkomstig gebruikt te worden.

ECOLOGISCHE DATA:

Afvoer per 1000 kg productie



De waardes van de nutriënten en de vitamines zijn van de tijd van schrijven.

Deze gegevens kunnen variëren door de natuurlijke variatie in de grondstoffen.

We behouden het recht voor de recepten te wijzigen. Voor de exacte waardes zie het label.